

Кишечные инфекции у детей

Кишечными называют инфекции, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта – гастриты, дуодениты, панкреатиты, колиты – все эти острые заболевания могут быть в наличии как по одному, так и несколько сразу.

Кишечная инфекция у детей – довольно распространенное состояние и причиной его могут быть самые различные возбудители – микробы – стафилококк, кишечная палочка, сальмонелла, палочка дизентерии и холерный вибрион.



Причиной любой кишечной инфекции являются нарушения правил гигиены, хранения и очистки воды, хранения продуктов питания и готовой еды – то есть человеческий фактор, и заболеть ребенок может лишь т.н. фекально-оральным путем, то есть получив бактерию через рот. Причем некоторое количество болезнетворных бактерий всегда присутствует в окружающей среде, но чтобы началось заболевание, бактерий должно быть много, или они должны найти в организме очень подходящую среду для размножения или слишком слабую защиту. Подтвердить наличие того или иного возбудителя можно лишь лабораторным путем, хотя некоторые инфекции отличаются и по клиническим признакам, но это больше касается болезней типа дизентерии и холеры.



Обычные, независимо от возбудителя, кишечная инфекция у детей **проявляется** через газообразование, тошноту, рвоту и диарею. Все эти симптомы могут быть как вместе, в каком-то комплексе или поодиночке. Необходимо помнить, что в первые часы заболевания эти неприятные проявления служат для самоочищения организма, поэтому давать препараты, останавливающие понос, например, имодиум – значит, продлять нахождение токсинов в организме. То же самое касается и рвоты, если она не становится упорной.



Поэтому не стоит стремиться прекратить эти проявления кишечной инфекции, наоборот, их надо усилить – пить и вызывать рвоту, делать клизмы, можно, со слабым раствором марганцовки.

Часто у маленьких детей нарушается общее состояние, повышается температура – в этом случае также надо вызвать врача, а до его прихода проводить описанные выше мероприятия. И последнее: в каких же **случаях** кишечная инфекция у детей должна стать поводом **осмотра врачом** и, возможно, **госпитализации** ребенка? Вот в каких:

- если невозможно поить ребенка из-за рвоты и значит, он нуждается в капельницах
- при обнаружении крови в стуле
- при появлении сильной боли в животе
- при учащении и усилении рвоты, присоединении к ней головной боли
- при отсутствии мочи более 6 часов, что говорит об обезвоживании
- при изменении внешнего вида ребенка – серые кожные покровы, заостренные черты лица, снижение температуры тела.

